Concours pour le recrutement de secrétaires médicaux
Saint-Lô – 27 avril 1992

corrigé

Document I :

Chimiothérapie : administration d'un produit chimique afin de guérir une maladie ou d'enrayer sa progression

Néoplasie : 1) syn. de tumeur, le plus souvent cancéreuse 2) formation d'une tumeur

Choc hémodynamique : insuffisance circulatoire (pression, débit, vitesse...)

GDS : Gaz Du Sang

Onde T : mesure de la récupération ventriculaire

Doppler : examen (par ultrasons) qui permet de mesurer les variations de la vitesse de circulation du sang dans un vaisseau (ex : quand il y a ne sténose ou une dilatation)

MI : Membre Inférieur

Phlébite : terme utilisé pour désigner la formation d'un caillot dans une veine, associé ou non à une inflammation de la veine

Etiologie : étude des causes d'une maladie

Coronarien : qui se rapporte aux vaisseaux coronaires

Fibroscopie : examen endoscopique effectué avec une sonde équipée d'un dispositif éclairant et grossissant

Sténose : diminution pathologique permanente d'un canal ou d'un orifice = rétrécissement

Carène : (syn. éperon trachéal) crête qui sépare les orifices supérieurs gauche et droit des bronches au niveau de la bifurcation trachéale

NFS : Numération, + Formule sanguine

Plaquettes : (syn. thrombocytes) cellules du sang ayant un rôle dans la coagulation (nombre normal 200 à 400000/$mm^{3)}$; durée de vie 8 à 10 jours, elles sont fabriquées par la moelle osseuse.

Leucocytes : (syn. globules blancs) cellules du sang ayant un rôle dans l'immunité. (nombre normal 7000/mm^3)

DOCUMENT II

CENTRE HOSPITALIER GENERAL XXX

Service de Gynécologie-obstétrique

75016 PARIS
Tél . 16.1.33.33.33.33

COMPTE-RENDU OPERATOIRE

Chirurgien : Dr Z

Mme HUR Mireille

Anesthésiste : Dr Y

Césarienne : incision - suite au monde / incision répété à + bians, refaites. anesthesie péridurale (refaite)

Césarienne itérative sous péridurale chez une deuxième pare, troisième geste, âgée de 30 ans, pour magnien limite à la radiopelvimétrie et antécédents de césarienne.

Pfannenstiel et excision de l'ancienne cicatrice, libération de nombreuses adhérences péritonéales.
Hystérotomie segmentaire transversale.
Extraction d'un foetus de sexe masculin criant aussitôt.
Liquide amniotique clair.
Délivrance manuelle suivie de révision utérine. — exploration manuelle de la cav. utérine vérification placenta ok
Fermeture de l'utérus en un plan par points extra muqueux, surjets sur le péritoine utérin.
Vérification des annexes. — ovaires + trompes
Fermeture plan par plan après toilette péritonéale et compte des compresses.
Drainage par Redon sous aponévrotique. (mb. muscles).

2e pare : 2e accouchement

troisième geste : troisième grossesse.
radiopelvimétrie : normale des dd du bassin.
Pfannenstiel : incision sus pubienne (cachée)
Hystérotomie : " paroi utérine
délivrance : sortie placenta + mb ovul.

Document III :

Consanguinité :1) le fait d'avoir le même père 2) chez plusieurs personnes le fait d'avoir un ascendant commun

Rubéole : Fièvre éruptive dangereuse en cas de grossesse (malformations):
Cytomégalovirus : virus du groupe des herpes, responsable d'infestons type : mononucléose, hépatite, pneumonie...
Toxoplasmose : maladie causée par un toxoplasme ( ) qui peut atteindre le fœtus sans que la mère paraisse atteinte et qui peut est la cause de lésions oculaires, nerveuses...
Listériose : infection due à la *listeria monocytogenes*, transmise à l'homme par les animaux ; elle peut entraîner une septicémie e très grave chez le nouveau-né

Hypertension artérielle gravidique : élévation de la tension artérielle pendant la grossesse

Dystocie : accouchement difficile quelle qu'en soit la cause

Problème **anoxique** : diminution d'apport en oxygène au niveau des tissus et des cellules

Ictère néonatal : jaunisse du nouveau-né (de 0 à 28 jours)

Exsanguinotransfusion : remplacement d'une partie du sang d'un malade par du sang frais. Perfusion dans une veine avec extraction simultanée de la même quantité de l'autre coté

Hypotrophie :nutrition insuffisante dont la conséquence chez le petit enfant est un développement insuffisant de la taille

Syndrome polyformatif : ensemble de signes, de lésions, de symptômes qui traduisent l'atteinte d'un organe ou d'un système.

Ototoxiques : toxique pour l'oreille
Aminosides :antibiotiques à large spectre, toxiques pour le rein et le nerf auditif

Audiogramme : méthode d'appréciation de l'acuité auditive pour les différentes fréquences sonores

Impédancemétrie : La notion d'impédance existe aussi pour les ondes mécaniques, notamment pour les ondes sonores, où elle est définie comme le quotient de la surpression par la vitesse de déplacement des particules du matériau parcouru par l'onde

Otoémissions acoustiques :

Cochléaires : qui se rapporte au limaçon de l'oreille interne,
Audiophonologie :
Audiophone : appareil acoustique destiné aux personnes atteintes de surdité, utilisant les os du crâne pour la transmissions des vibrations sonores au nerf auditif